

АЛЛЕРАЙЗ

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Аллерайз

Международнонепатентованное название:

Олопатадин.

Лекарственная форма: глазные капли.

Состав:

Олопатадина гидрохлорид USP экв. олопатадину 0,1% w/v

Бензалкония хлорида раствор NF 0,005% w/v

(в качестве консерванта)

Стерильная водяная основа q.s.

Фармакотерапевтическая группа: противоаллергическое средство -H1-гистаминовых рецепторов блокатор.

Код АТХ: S01GX09.

Фармакологическое действие:

Фармакодинамика:

Олопатадин является селективным ингибитором H1-гистаминовых рецепторов, а также ингибирует высвобождение медиаторов воспаления из тучных клеток. Оказывает выраженное противоаллергическое действие.

Не оказывает эффекта на α -адренергические, допаминовые, мускариновые типа 1 и 2, а также серотониновые рецепторы.

Фармакокинетика:

При местном применении системная абсорбция низкая.

Максимальная концентрация (С_{max}) олопатадина в плазме крови достигается в течение 2 часов после местного применения и составляет от 0,5 нг/мл и менее до 1,3 нг/мл. Период полураспада (T_{1/2}) в плазме составляет 3 часа. Выводится преимущественно почками, 60-70% в неизмененном виде.

Показания к применению:

аллергические конъюнктивиты.

Противопоказания:

повышенная чувствительность к компонентам препарата;

детский возраст до 3 лет;

беременность и период лактации.

С осторожностью: у пациентов с сопутствующим синдромом «сухого» глаза и заболеваниями роговицы.

Беременность и период лактации:

Достаточного опыта по применению препарата во время беременности и в период лактации нет. Применение препарата при беременности, в период лактации не рекомендуется.

Способ применения и дозы:

Местно. Перед применением встряхнуть флакон. Закапывают по 1 капле в конъюнктивальный мешок 2 раза в день (с интервалом 8 часов).

Продолжительность лечения до четырех месяцев.

При необходимости препарат может применяться в комбинации с другими препаратами. В этом случае интервал между их применением должен составлять не менее 5 минут.

Побочное действие:

Местные. В отдельных случаях (менее 5%): затуманивание зрения, жжение и боль в глазах, слезотечение, ощущение инородного тела в глазу, гиперемия конъюнктивы, кератит, ирит, припухлость век.

В 0,1-1% случаев отмечаются слабость, головная боль, головокружение, тошнота, фарингит, ринит, синусит, изменение вкуса.

Передозировка:

При местном применении передозировка маловероятна. При попадании в глаза избыточного количества препарата рекомендуется промыть глаза теплой водой.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:

При необходимости может применяться в комбинации с другими местными офтальмологическими препаратами. В этом случае интервал между их применением должен составлять не менее 5 минут.

Особые указания:

Препарат Аллерайз содержит консервант бензалкония хлорид, который может абсорбироваться контактными линзами. Перед закапыванием препарата линзы следует снять и установить обратно не ранее, чем через 15-20 минут после закапывания препарата.

Не следует прикасаться кончиком флакона к векам, коже окологлазничной области и другим поверхностям, чтобы избежать загрязнения раствора.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами:

Если у пациента после применения препарата временно снижается чёткость зрения, не рекомендуется управлять автомобилем и заниматься видами деятельности, требующими повышенного внимания до его восстановления.

Форма выпуска:

Капли глазные по 5 мл в пластиковом флакон-капельнице. Один флакон вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C и в местах, недоступных для детей.

Срок годности:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности. Использовать в течение 4-х недель после вскрытия флакона.

Условия отпуска:

По рецепту врача.