

АЙЛИНДА

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Айлинда.

Международное непатентованное название: Карбоксиметилцеллюлоза + Глицерин.

Лекарственная форма: глазные капли.

Состав: каждый мл содержит:

Натрий карбоксиметилцеллюлоза USP 0,5% w/v;

Глицерин BP 0,5% w/v;

Оксихлоро комплекс стабилизированный 0,01% w/v;

(в качестве консерванта)

Стерильная водная основа q.s.

Фармакотерапевтическая группа: Искусственные слезы и прочие индифферентные препараты.

Код АТХ: S01XA20.

Фармакологическое действие:

Фармакодинамика:

Натрий карбоксиметилцеллюлоза не имеет сенсibiliзирующих свойств и при использовании в конечном счете, превращается в компоненты природных слез.

Препарат используется для облегчения раздражение и сухости глаз. Наиболее частыми причинами сухих глаз является ветер, солнце, отопление/кондиционирование воздуха, работа за компьютером/чтение, а так же некоторые лекарственные препараты.

Глазные капли Айлинда обеспечивает длительный увлажняющий эффект, эффективно увлажняет, снимает напряжение глаз и надолго возвращает комфортное состояние.

Фармакокинетика:

Благодаря своему высокому молекулярному весу проникновение Натрия карбоксиметилцеллюлозы в роговицу маловероятна.

Показания к применению:

Профилактика и уменьшения симптомов раздражения при сухости и усталости глаз или в результате воздействия ветра или солнца.

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- противопоказано младенцам и маленьким детям в возрасте до 3 лет.

Способ применения и дозы:

Аккуратно закапывают по 1 капле препарата в конъюнктивальный мешок каждого глаза 3-4 раза в сутки, до устранения болезненных симптомов. Перед закапыванием рекомендуется вымыть руки.

После закапывания следует плотно закрыть колпачок флакона.

Побочные действия:

Болезни глаз: часто (> 1/100, <1/10): жжение, сухость глаз, раздражение глаз / зуд;

редко (> 1/1000, <1/100): отек век, слезотечение, веки эритема, гиперемия конъюнктивы, боль в глазах, выделения из глаз.

Передозировка:

Симптомы: возможно усиление побочных действий.

Лечение: симптоматическое и поддерживающее.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не использовать капли одновременно с другими препаратами или офтальмологическими средствами, т.к. это может изменить их действие.

Особые указания:

Вскоре после закапывания может возникнуть кратковременная нечеткость зрения, боль в глазах, раздражение глаз и покраснение, которые проходят самостоятельно. Если эти реакции не проходят самостоятельно в течении 72 часов то, но нужно прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

Извлекайте контактные линзы перед применением препарата, их снова можно будет установить вскоре после закапывания.

Не дотрагиваться до кончика флакона и стараться не допускать его контакта с поверхностью глаза.

Не применять внутрь.

Форма выпуска:

Капли глазные во флаконе 10 мл. Один флакон вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C и в местах, недоступных для детей. Не замораживать.

Срок годности:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.



Произведено для:
BELINDA Laboratories
Лондон, Великобритания
Производитель:
Нитин Лайфсайнс Лтд.,
Индия