

# ЭТОДЕКС

## ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению лекарственного средства

**Торговое название:** Этодекс.

**Международное непатентованное название:** гексэтидин.

**Лекарственная форма:** спрей для местного применения.

**Состав:**

**Действующее вещество:** Гексэтидин 2 мг/мл

**Вспомогательные вещества:** сахарин натрия, эвкалиптовое масло, масло цветков апельсина, масло мяты, левоментол, метилсалицилат, глицерин 85%, этанол 96%.

**Фармакотерапевтическая группа:** Антисептическое средство.

**Код АТХ:** A01AB12.

**Фармакологическое действие:**

**Фармакодинамика:**

Противомикробное действие гексэтидина связано с подавлением окислительных реакций метаболизма бактерий (антагонист тиамина). Препарат обладает широким спектром антибактериального и противогрибкового действия, в частности в отношении грамположительных бактерий и грибов рода *Candida*, однако гексэтидин может также оказывать эффект при лечении инфекций, вызванных, например, *Pseudomonas aeruginosa* или *Proteus*. В концентрации 100 мг/мл препарат подавляет большинство штаммов бактерий. Развитие устойчивости не наблюдалось. Гексэтидин оказывает слабое анестезирующее действие на слизистую оболочку.

**Фармакокинетика:**

Гексэтидин очень хорошо адгезируется на слизистой оболочке и практически не всасывается.

После однократного применения действующего вещества его следы обнаруживают на слизистой десен в течение 65 ч. В зубном налете активные концентрации сохраняются в течение 10–14 ч после применения.

**Показания к применению:**

В качестве симптоматического средства.

Симптоматическое лечение при воспалительно-инфекционных заболеваниях полости рта и гортани:

- тонзиллит, ангина (в т. ч. ангина Плаута–Венсана, ангина боковых валиков), фарингит, гингивит, стоматит, глоссит, пародонтоз;
- грибковые заболевания;
- профилактика инфекционных осложнений до и после оперативных вмешательств на полости рта и гортани и при травмах, в т. ч. профилактика инфицирования альвеол после экстракции зуба;
- гигиена полости рта, в т. ч. и для устранения неприятного запаха изо рта.

**Противопоказания:**

- повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата;
- эрозивно-десквамозные поражения слизистой оболочки полости рта;
- детский возраст до 3 лет.

**Беременность и период лактации:**

Сведений о каких-либо нежелательных эффектах гексэтидина при беременности и в период грудного вскармливания нет. Тем не менее, перед назначением гексэтидина беременным или кормящим женщинам врач должен тщательно взвесить пользу и риск лечения, учитывая отсутствие достаточных данных о проникновении препарата через плаценту и в грудное молоко.

**Способ применения и дозы:**

Местно.

*Дети от 3 до 8 лет:* применение препарата возможно после консультации врача.

*Взрослые и дети старше 8 лет:* обрабатывают пораженные участки при задержке дыхания, по 1 впрыскиванию в течение 1–2 секунд 2 раза в сутки.

Гексэтидин адгезируется на слизистой оболочке и благодаря этому дает стойкий эффект. В связи с этим препарат следует применять после еды.

**Общие рекомендации по введению**

Препарат распыляют в полости рта или глотке. С помощью спрея можно легко и быстро обработать пораженные участки. Необходимо выполнить следующие действия:

Возьмите в руку флакон и встряхните. Направьте флакон распылителем к себе. Поверните наконечник распылителя против часовой стрелки под углом в 90 градусов. Направить распылитель на пораженный участок полости рта или глотки; во время введения препарата флакон следует удерживать постоянно в вертикальном положении; ввести необходимое количество препарата, нажав крышку распылителя 2–3 раза, не дышать при введении спрея. После употребления вытрите наконечник распылителя бумажной салфеткой и поверните наконечник распылитель в первоначальную позицию. Длительность лечения определяется врачом.

**Побочное действие:**

Нежелательные реакции, выявленные при пострегистрационном применении лекарственного препарата, были классифицированы следующим образом: очень частые ( $\geq 1/10$ ), частые ( $\geq 1/100$ ,  $< 1/10$ ), не частые ( $\geq 1/1000$ ,  $< 1/100$ ), редкие ( $\geq 1/10000$ ,  $< 1/1000$ ), очень редкие ( $< 1/10000$ ), частота неизвестна (частота возникновения не может быть оценена на основании имеющихся данных).

**Нарушения со стороны иммунной системы.** Очень редко: реакции гиперчувствительности (в том числе крапивница), ангионевротический отек.

**Нарушения со стороны нервной системы.** Очень редко: агевзия, дисгевзия.

**Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения.** Очень редко: кашель, одышка, обусловленная появлением реакции гиперчувствительности.

**Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта.** Очень редко: сухость во рту, дисфагия, тошнота, увеличение слюнных желез, рвота.

**Общие расстройства и нарушения в месте введения.** Очень редко: реакции в месте нанесения (в том числе раздражение слизистой оболочки полости рта и глотки, ощущение жжения, парестезия ротовой полости, изменение окраски языка, изменение окраски зубов, воспаление, образование пузырей и изъязвления).

Если любые указанные в инструкции побочные эффекты усугубляются или Вы заметили другие побочные эффекты, рекомендуется обратиться к врачу.

**Передозировка:**

Маловероятно, что гексэтидин может оказывать токсическое действие при применении согласно инструкции по применению лекарственного препарата.

Проглатывание большого количества препарата, содержащего этанол, может привести к появлению признаков/симптомов алкогольной интоксикации.

При любых случаях передозировки немедленно проконсультируйтесь с врачом. Лечение симптоматическое, как при алкогольной интоксикации. Промывание желудка необходимо в течение 2 часов после проглатывания избыточной дозы.

**Взаимодействие с другими лекарственными препаратами:**

Данные отсутствуют.

**Особые указания:**

Специальных предписаний нет.

Дети могут применять препарат с такого возраста, когда нет опасности неконтролируемого его проглатывания или когда они не сопротивляются постороннему предмету (распылителю) во рту при применении спрея и способны задерживать дыхание при впрыскивании препарата.

Препарат содержит около 78 % (о/о) этанола 96 %.

Если лекарственное средство пришло в негодность или истек срок годности – не выливайте его в сточные воды и не выбрасывайте на улицу. Поместите лекарственное средство в пакет и положите в мусорный контейнер. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности**

Лекарственный препарат Этодекс, спрей для местного применения не оказывает влияния на способность управлять транспортными средствами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности.

**Форма выпуска:**

Спрей для местного применения 0,2%. 30 мл препарата в стеклянном флаконе с распылителем. Один флакон вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

**Условия хранения:**

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C и в местах, недоступных для детей. Не замораживать.

**Срок годности:**

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

**Условия отпуска:**

Без рецепта.