

# ГАНВИРОФТ

## Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

**Торговое название:** Ганвирофт.

**Международное непатентованное название:**  
ганцикловир.

**Лекарственная форма:** гель глазной.

**Состав:** каждый грамм геля содержит:  
Ганцикловир USP 1,5 мг.

**Фармакотерапевтическая группа:**

Противовирусный препарат для местного применения в офтальмологии.

**Код АТХ:** S01AD09.

**Фармакологическое действие:**

**Фармакодинамика:**

Противовирусный препарат для местного применения в офтальмологии. Ганцикловир является нуклеозидом, который ингибирует репликацию человеческих вирусов простого герпеса 1 и 2 типа. В инфицированных клетках ганцикловир преобразуется в активную форму ганцикловира - ганцикловир трифосфата. Фосфорилирование происходит преимущественно в инфицированных клетках, причем концентрация ганцикловира трифосфата в неинфицированных клетках оказывается в 10 раз меньше.

Противовирусная активность ганцикловира трифосфата заключается в ингибировании синтеза вирусной ДНК с использованием двух механизмов: конкурентного ингибирования вирусной ДНК-полимеразы и прямого включения в вирусную ДНК с нарушением терминации цепи и предотвращением ее репликации.

**Фармакокинетика:**

При офтальмологическом применении препарата 5 раз в день в течение 11-15 дней при лечении поверхностного герпетического кератита, уровни ганцикловира в плазме очень низкие: в среднем 0,013 мкг/мл (0-0,037).

Ганцикловир быстро проникает в роговицу и передний отдел глаза; через несколько часов концентрация препарата во влаге передней камеры превышает среднюю эффективную дозу.

**Показания к применению:**

Лечение острого кератита, вызванного вирусом простого герпеса.

**Противопоказания:**

✓ гиперчувствительность к ганцикловиру, ацикловиру или любому из компонентов препарата.

✓ беременность и период грудного вскармливания;

✓ детский возраст до 2 лет.

**Беременность и период лактации:**

Не рекомендуется применение препарата во время беременности или кормления грудью, за исключением отсутствия альтернативных способов лечения. Для женщин детородного возраста необходимо использование контрацепции.

Из-за выявленной генотоксичности, мужчинам, использующим глазной гель Ганвирофт, рекомендуется применять локальные меры контрацепции (презерватив) в ходе лечения и в течение трех месяцев после его завершения.

**Способ применения и дозы:**

По 1 капле 5 раз в день до полной реэпителизации роговицы, затем по 1 капле 3 раза в день в течение 7 дней.

Продолжительность лечения обычно не превышает 21 дня.

**Побочные действия:**

*Со стороны органа зрения:* наиболее частыми побочными эффектами являются затуманивание зрения (60%), раздражение глаза (20%), точечный кератит (5%) и гиперемия конъюнктивы (5%).

**Передозировка:**

На данный момент информация о передозировке при местном применении у человека отсутствует.

**Взаимодействия с другими лекарственными препаратами:**

Не выявлено.

**Особые указания:**

Данный лекарственный препарат не предназначен для лечения цитомегаловирусной инфекции сетчатки.

Эффективность в отношении кератоконъюнктивитов, вызванных другими типами вирусов не была установлена.

Никаких специальных исследований у пациентов с иммунодефицитом не проводилось.

Не следует допускать контакта препарата с мягкими контактными линзами. Удалите контактные линзы перед применением препарата, и повторно установите их не ранее, чем через 15 минут после закапывания.

*Влияние на способность управления транспортными средствами и механизмами:*

Пациент должен воздерживаться от управления автомобилем или работ с сложной техникой в случае любого нарушения зрения в ходе лечения препаратом.

**Форма выпуска:**

Гель глазной 5 г в тубе. Одна туба вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

**Условия хранения:**

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Не замораживать.

**Срок годности:**

36 месяцев. Не использовать по истечении срока годности.

После вскрытия тубы, препарат можно использовать в течение 1 месяца. По истечении этого срока препарат следует выбросить.

**Условия отпуска:**

По рецепту врача.



Произведено для:  
**BELINDA Laboratories LLP**  
Лондон, Великобритания

Производитель:  
Аристофарма Лтд.,  
Бангладеш.