

ИСТАРАН

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Истаран.

Международное непатентованное

название: комбинированный состав.

Лекарственная форма: Глазные / назальные капли.

Состав:

Нафазолина гидрохлорид USP	0,056% w/v
Цинка сульфат USP	0,12% w/v
Хлорфенирамина малеат USP	0,01% w/v
Борная кислота NF	1,25% w/v
Хлорид натрия USP	0,05% w/v
Хлорбутанол NF	0,50% w/v

(в качестве консерванта)

Стерильная водяная буферная основа q.s.

Фармакотерапевтическая группа:

Сосудосуживающий препарат для местного применения в офтальмологии и ЛОР-практике. α_2 -адреномиметическое средство. Блокатор гистаминовых H_1 -рецепторов.

Код АТХ: S01GA51.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика:

Комбинированный препарат для местного применения в офтальмологии и ЛОР-практике. Нафазолин, альфа 2-адреномиметик. При местном применении оказывает быстрое, выраженное и продолжительное сосудосуживающее действие на сосуды слизистой оболочки (уменьшает отечность, гиперемию, экссудацию). Облегчает носовое дыхание при ринитах. Сужает глазные сосуды, быстро уменьшает отечность. Через 5-7 дней применения возникает толерантность.

Цинка сульфат оказывает антисептическое, вяжущее, подсушивающее и местное противовоспалительное действие.

Хлорфенирамин, блокатор H_1 -гистаминовых рецепторов, оказывает противоаллергическое действие, уменьшает выраженность местных экссудативных проявлений, отек и гиперемию слизистой оболочки носа, носоглотки и придаточных пазух носа, устраняет зуд в глазах и носу, ринорею, заложенность носа, слезотечение.

Истаран может оказывать резорбтивное действие.

Фармакокинетика:

Препарат предназначен для местного применения, данных о системной абсорбции не имеется.

Показания к применению:

- риниты (острые, аллергические), синуситы;
- носовые кровотечения (как сосудосуживающее средство) для остановки и облегчения - проведения риноскопии;
- конъюнктивиты (аллергические, хронические);
- астенопические расстройства (нарушение аккомодации при повышенной зрительной нагрузке);
- весенние конъюнктивиты (в составе комбинированной терапии);
- отек гортани аллергического генеза, отек гортани на фоне облучения, гиперемия слизистой оболочки после операций на верхних дыхательных путях.

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к любому компоненту препарата;
- артериальная гипертензия;
- выраженный атеросклероз;
- тиреотоксикоз;
- детский возраст (до 6 лет);
- хронический ринит;
- тяжелые заболевания глаз;
- сахарный диабет;
- одновременный прием ингибиторов MAO и период до 14 дней после окончания их применения.

Беременность и период лактации:

Данные о безопасности применения препарата при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) не предоставлены. Назначение препарата Истаран в период беременности и в период лактации оправдано только в том случае, если ожидаемая польза для матери выше потенциального риска для плода.

В период лактации назначать Истаран необходимо с осторожностью.

Способ применения и дозы:

Глазные капли:

Взрослым и детям старше 6 лет

рекомендуемая доза препарата составляет 1-2 капли в конъюнктивальный мешок пораженного глаза (или обоих глаз) до 4 раз в сутки.

Назальные капли:

Взрослым и детям старше 6 лет

рекомендуемая доза препарата составляет 1-2 капли в каждый носовой ход 3-4 раза в сутки.

Продолжительность лечения от 3 до 5 дней или по указанию врача.

Побочные действия:

Местные действия: мидриаз, слезотечение, повышение внутриглазного давления, усиление гиперемии, раздражение, дискомфорт, жжение, при длительном применении (более 1 недели) — отек слизистой оболочки носа, атрофический ринит.

Системные действия: головокружение, головная боль, тошнота, слабость, сонливость, раздражительность, повышение артериального давления, тахикардия.

Передозировка:

Препарат для местного применения.

Симптомы: снижение температуры тела, брадикардия, повышение АД.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Одновременный прием с ингибиторами MAO и период до 14 дней после окончания их применения, повышает риск развития выраженной артериальной гипертензии (высвобождение депонированных катехоламинов под действием нафазолина). Замедляет всасывание местно анестезирующих средств.

На фоне приема ингибиторов MAO замедляется метаболизм хлорфенирамина в печени, что может привести к усилению его действия.

Особые указания:

Препарат предназначен только для *местного* применения.

Следует учитывать, что при длительном применении препарата Истаран возможно развитие явления тахифилаксии (ослабление эффекта). Рекомендуется непродолжительный перерыв после 5-7 дней лечения препаратом.

Не рекомендуется применение препарата при *хронических ринитах*.

С осторожностью применять у пациентов с тяжелыми сердечно - сосудистыми заболеваниями, в том числе, с нарушениями сердечного ритма, трудно контролируемой артериальной гипертензией, а также у пациентов с сахарным диабетом, в особенности, со склонностью к кетоацидозу.

С осторожностью следует применять глазные капли Истаран *при вождении автомобиля, работе со сложными механизмами*, так как сразу после закапывания препарата возможно временное снижение остроты зрения.

Форма выпуска:

Глазные/назальные капли 10 мл в пластиковом флаконе. Один флакон в картонной упаковке вместе с инструкцией по применению.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C и в местах, недоступных для детей. Не замораживать. После вскрытия содержимое флакона использовать в течение месяца.

Срок годности:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.