

# ИВИЛИКС

## Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

**Торговое наименование:** Ивиликс.

**Международное непатентованное название:**  
Нет.

**Лекарственная форма:** Сироп для приема внутрь.

**Состав:** один мл препарата содержит:  
*активное вещество* - сухого экстракта листьев плюща (4-8:1), экстракционный растворитель: этанол 30 % (м/м) – 7,00 мг;

*вспомогательные вещества:* сорбитол жидкий (монокристаллический), калия сорбат, кислота лимонная безводная, кантановая камедь, ароматизатор вишни Морелло (дигидрокумарин, альфа терпинеол, фенилэтиловый спирт, бензальдегид, масло лаймы, натуральный эвгенол, глюкоза, кремния диоксид), вода очищенная.

**Фармакотерапевтическая группа:**

Респираторная система. Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Экспекторанты, исключая комбинации с подавляющими кашель.

Отхаркивающие препараты. Плюща листьев экстракт.

**Код АТХ:** R05CA12.

**Фармакологические свойства:**

**Фармакодинамика:**

Растительный препарат от кашля. Оказывает отхаркивающее, муколитическое и бронхоспазмолитическое действие. Снижает вязкость мокроты и способствует ее отхождению.

**Фармакокинетика:**

Препарат представляет собой сухой экстракт листьев плюща и содержит комплекс биологически активных веществ (тритерпеновые сапонины), в связи с чем проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

**Показания к применению:**

- отхаркивающее средство, применяемое в составе комплексной терапии острых и хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой.

**Способ применения и дозы:**

Внутрь, после еды.

Назначают *детям от 2 до 6 лет* – по 2,5 мл 2 раза в сутки, *детям от 6 до 11 лет* – по 2,5 мл 3 раза в сутки, *взрослым и подросткам* – по 5 мл 3 раза в сутки. Дозирование препарата производится с помощью мерного колпачка.

Каждый прием употреблением флакон необходимо хорошо взболтать. В период лечения препаратом рекомендуется употреблять достаточное количество теплой жидкости (вода, чай и др.).

Длительность лечения – 1 неделя. Для закрепления эффекта, рекомендуется продолжить лечение еще 2-3 дня после исчезновения симптомов болезни.

Если улучшение не наступает, необходимо обратиться к врачу.

**Противопоказания:**

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- период беременности и кормления грудью;
- наследственная непереносимость фруктозы, мальабсорбция глюкозы/галактозы;
- детский возраст до 2 лет.

**Беременность и лактация:**

В связи с недостаточностью данных по безопасности, не рекомендуется применять сироп Ивиликс беременным и кормящим грудью женщинам.

**Побочное действие:**

Определение частоты побочных явлений проводится в соответствии со следующими критериями: очень часто ( $\geq 1/10$ ), часто ( $\geq 1/100$  до  $< 1/10$ ), нечасто ( $\geq 1/1000$  до  $< 1/100$ ), редко ( $\geq 1/10000$  до  $< 1/1000$ ), очень редко ( $< 1/10000$ ), неизвестно (невозможно оценить на основании имеющихся данных)

*Очень редко*

- аллергические реакции (такие, как одышка, отек

Квинке, экзантема, крапивница);

- тошнота, рвота, диарея;
- легкий слабительный эффект.

**Передозировка:**

**Симптомы:** при приеме больших доз (в три раза превышающих рекомендованные), может развиться тошнота, рвота и диарея.

**Лечение:** отмена препарата, симптоматическая терапия.

**Взаимодействия с другими лекарственными препаратами:**

Не поступали сообщения о лекарственном взаимодействии с другими лекарственными средствами.

Препарат не следует применять одновременно с противокашлевыми лекарственными препаратами, уменьшающими образование мокроты, так как это затрудняет отхождение разжиженной мокроты.

**Особые указания:**

Не следует принимать препарат в дозах, превышающих рекомендованные в инструкции. Не рекомендуется применять одновременно с препаратами, содержащими кодеин и другими противокашлевыми лекарственными средствами.

Пациентам с гастритом или язвой желудка, необходимо принимать с осторожностью. При заболеваниях органов дыхания, сопровождающихся затрудненным дыханием, лихорадкой, длительным кашлем или мокротой с примесью крови, необходимо немедленно обратиться к врачу.

При отсутствии эффекта от лечения в течении 7 дней или ухудшении состояния, необходимо обратиться к врачу.

Сироп Ивиликс содержит сорбитол, поэтому пациенты с наследственной непереносимостью фруктозы, мальабсорбцией глюкозы/галактозы, не должны применять препарат.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами и потенциально опасными механизмами:**

Нет данных о влиянии препарата, на способность к управлению транспортными средствами и проведению работ с движущимися механизмами, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Форма выпуска:**

По 100 мл во флакон из темного стекла (класса III) с завинчивающейся полиэтиленовой крышкой.

По 1 флакону с мерным стаканчиком вместе с инструкцией по медицинскому применению помещают в пачку из картона.

**Срок хранения**

2 года.

Срок хранения после первого вскрытия флакона – 3 месяца.

Не применять по истечении срока годности.

**Условия хранения**

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Не замораживать.

**Условия отпуска:**

Без рецепта.



Произведено по:  
**BELINDA Laboratories**  
Лондон, Великобритания  
Производитель:  
VETPROM AD,  
Радомир, Болгария