

ОТИБЕЛС

ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Отибелс.

Международное непатентованное название: комбинированный препарат.

Лекарственная форма: капли ушные.

Состав: 1 г раствора содержит:

Феназон 40 мг;

Лидокаина гидрохлорид 10 мг.

Вспомогательные вещества: натрия тиосульфат - 1 мг, этанол - 221,8 мг, глицерол - 709 мг, вода - 18,2 мг.

Фармакотерапевтическая группа: местный противовоспалительный, анальгезирующий антисептик.

Код АТХ: S02DA30.

Фармакологические свойства:

Фармакодинамика:

Феназон обладает противовоспалительным и анальгезирующим действием.

Лидокаин обладает местноанестезирующим действием.

Фармакокинетика:

Препарат не проникает в организм при неповрежденной барабанной перепонке.

Показания к применению:

Местное симптоматическое лечение и обезболивание у детей с рождения и взрослых при:

- среднем отите в остром периоде в момент воспаления;
- отите как осложнении после гриппа;
- баротравматическом отеке.

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- перфорация барабанной перепонки.
- повышенная чувствительность к производным пиразолона (лекарственные средства, содержащие метамизол натрия, фенилбутазон).

Беременность и период лактации:

Ограничения применения препарата во время беременности и в период кормления грудью отсутствуют при условии неповрежденной барабанной перепонки.

Способ применения и дозы:

Отибелс применяется местно, путем закапывания в наружный слуховой проход 2-3 раза в день по 3-4 капли. Во избежание соприкосновения холодного раствора с ушной раковиной, флакон перед применением следует согреть в ладонях.

Продолжительность применения препарата Отибелс не более 10 дней, после чего следует пересмотреть назначенное лечение.

После первого вскрытия флакона препарат следует использовать в течение 6 месяцев. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Побочные действия:

Существует риск возникновения аллергических реакций, раздражения и гиперемии слухового прохода.

Передозировка:

Данные о передозировке препарата Отибелс не предоставлены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

В настоящее время информация о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствует.

Особые указания:

Необходимо убедиться в целостности барабанной перепонки перед началом применения препарата. В случае применения препарата при перфорированной барабанной перепонке препарат может вступить в контакт с органами среднего уха и привести к возникновению осложнений.

Информация для спортсменов: препарат содержит активный компонент, способный дать положительную реакцию при допинг-контроле.

Форма выпуска:

Капли ушные во флаконе из янтарного стекла с завинчивающейся крышкой пипеткой. Один флакон вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C и в местах, недоступных для детей.

Срок годности:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.