

ПОВИЛОР

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Повилор.

Международное непатентованное название: повидон-йод + эвкалипта листьев масло.

Лекарственная форма: спрей для местного применения (для ротовой полости и горла).

Состав: один флакон 40 мл содержит:

действующие вещества: повидон-йод 0,4 г (0,1-1,0% w/v), масло листьев эвкалипта шаровидного 0,4 г (0,1-1,0% w/v);

вспомогательные вещества: пропиленгликоль, феноксиэтанол, этилгексилглицерин, вода очищенная, ароматизатор.

Фармакологическая группа: Средства, применяемые при заболеваниях горла. Антисептики.

Код АТХ: R02AA.

Фармакологическое действие:

Фармакодинамика:

Комбинированный препарат для местного применения при заболеваниях полости рта и ЛОР-органов.

Повидон-йод является водорастворимым комплексным соединением йода с синтетическим нетоксичным полимером-повидоном. При контакте со слизистой оболочкой высвобождается йод, который оказывает выраженное антисептическое действие вследствие своего высокого окислительного свойства. Благодаря этому препарат оказывает выраженное бактерицидное, фунгицидное, спороцидное и выборочно противовирусное действие, активен к простейшим.

Масло листьев эвкалипта шаровидного обладает бактерицидным, противовирусным, анальгезирующим и противовоспалительным действием. Оказывает профилактический и антисептический эффект, снижает вероятность развития воспалительных заболеваний дыхательных путей и боли в горле.

Фармакокинетика:

При контакте со слизистыми оболочками 30% повидон-йода превращается в йодиды, а остальное в активный йод. Йодиды накапливаются главным образом в щитовидной железе. Свободные йодиды выделяются в основном с мочой, небольшое количество с испражнениями, слюной, потом. Йодиды переходят через плацентарный барьер и выделяются в грудное молоко.

Показания к применению:

- инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки, в т.ч. ангины, тонзиллиты, тонзиллофарингиты, глосситы, стоматиты, афты;
- для обработки полости рта и глотки при хирургических вмешательствах на дыхательных путях и полости рта и в послеоперационном периоде;
- для лечения инфекций полости рта и горла, возникающих при химиотерапии;
- при стрептококковых ангинах применяется как дополнительное средство при лечении антибиотиками.

Способ применения и дозировка:

Спрей применяют местно на слизистую оболочку полости рта и глотки.

Перед первым применением препарата несколько раз нажать на распылитель до появления дисперсной струи. Перед дальнейшим применением сделать 2-3 нажатия, чтобы раствор попал в распылитель и после нажатия разбрызгивался, после чего препарат можно применять.

Применять препарат следует, как правило, 2-3 раза в сутки, по одному впрыскиванию направо и налево в полость рта и глотки. В момент впрыскивания необходимо задержать дыхание.

Апplikатор до и после применения промывают горячей водой.

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата.
- гипертиреоз,
- аденома или нарушении функции щитовидной железы;
- пациентам с декомпенсированной сердечной, почечной или печеночной недостаточностью;
- детский возраст до 6 лет;
- лицам, которым планируется проведение диагностики или терапии радиоактивным йодом (в течение 2 недель до и после исследования).

Побочное действие:

В отдельных случаях могут проявляться аллергические реакции, что может потребовать отмены препарата.

Длительное применение повидон-йода может привести к йодизму (металлический привкус во рту, повышенное слюноотделение, отеки глаз или гортани, отек легких, кожные высыпания, расстройства со стороны пищеварительного тракта).

Передозировка:

Симптомы: металлический привкус во рту, рвота, боли в области желудка и диарея. В течение 1-2 дней возможно проявление анурии, отека голосовой щели, приводящий к асфиксии, аспирационной пневмонии или отека легких. В некоторых случаях может развиваться сосудистая недостаточность.

Лечение: проводят симптоматическую терапию. Специфического антидота нет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не рекомендуется применять препарат вместе с другими средствами для применения в полости рта и глотки (в первую очередь, с перекисью водорода, в связи с инактивацией препарата).

Особые указания:

Необходимо избегать контакта с глазами. Если раствор попал в глаза, следует вымыть его с помощью воды.

Форма выпуска:

Спрей для местного применения (для ротовой полости и горла) в пластмассовом флаконе 40 мл, снабженном механическим распылителем и крышкой, предохраняющий распылитель. Флакон помещён в картонную коробку вместе с инструкцией по применению.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Не замораживать.

Срок годности:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.