

ТАУРЕНС

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Тауренс.

Международное непатентованное

название: таурин.

Лекарственная форма: глазные капли.

Состав:

Таурин USP 4% w/v

Стабилизированный оксихлорный

комплекс 0,01% w/v

(в качестве консерванта)

Стерильная водная основа q.s.

Фармакотерапевтическая группа:

Офтальмологические препараты.

Офтальмологические препараты другие.

Код АТХ: S01XA.

Фармакологическое действие:

Фармакодинамика:

Таурин является серосодержащей аминокислотой, образующейся в организме в процессе превращения цистеина. Стимулирует процессы репарации и регенерации при заболеваниях дистрофического характера и заболеваниях, сопровождающихся значительным нарушением метаболизма тканей глаза.

Способствует нормализации функции клеточных мембран, активизации энергетических и обменных процессов, сохранению электролитного состава цитоплазмы за счет накопления K⁺ и Ca²⁺, улучшению условий проведения нервного импульса.

Фармакокинетика:

При местном применении системная абсорбция низкая.

В тканях организма практически не подвергается окислению. В свободном виде обнаруживается в печени, мышцах, сердечной, нервной, мозговой тканях, в крови (в форменных элементах крови –

больше, чем в плазме). Выводится почками.

Показания к применению:

Препарат назначают взрослым при:

✓ дистрофиях роговицы;

✓ старческих, травматических, лучевых

и других видах катаракт;

✓ травмах роговицы (в качестве

стимулятора репаративных процессов);

✓ первичной открытоугольной

глаукоме в сочетании с β-

адреноблокаторами (для улучшения

оттока водянистой влаги).

При всех показаниях препарат

применяется в составе комплексной

терапии.

Противопоказания:

✓ повышенная чувствительность к

компонентам препарата;

✓ детский и подростковый возраст до

18 лет.

Беременность и период лактации:

Достаточного опыта по применению

препарата во время беременности,

кормления грудью нет. Возможно

применение препарата Тауренс по

назначению лечащего врача, если

ожидаемый лечебный эффект

превышает риск развития возможных

побочных эффектов для плода и

ребенка.

Способ применения и дозы:

Для субконъюнктивального применения.

При катарактах Тауренс назначают

в виде инстилляций по 2-3 капли в каждый

глаз 2-4 раза в день ежедневно на

протяжении 3-х месяцев. Курсы

повторяют с месячным интервалом. При

травмах применяют в таких же дозах в

течение 1 месяца.

При открытоугольной глаукоме (в

сочетании с бутаминамидрохлоридом и его комбинированными формами или тимололом) — по 1-2 капли 2 раза в день, за 15-20 мин до назначения одного из гипотензивных средств, в течение 6 недель с последующей отменой на 2 недели.

Особые группы пациентов.

Дети.

Данные по эффективности и безопасности лекарственного средства у детей и подростков в возрасте до 18 лет отсутствуют.

Пациенты пожилого возраста.

Коррекция дозы не требуется.

Пациенты с печеночной/почечной недостаточностью.

Данные отсутствуют.

Побочные действия:

Аллергические реакции.

Если указанные в инструкции побочные эффекты усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка:

Данные о передозировке отсутствуют.

Взаимодействие с другими

лекарственными препаратами:

Имеются данные об эффективности препарата при совместном использовании с β-блокаторами для лечения открытоугольной глаукомы.

Усиление эффекта достигается за счет увеличения коэффициента легкости оттока и снижения продукции водянистой влаги.

При необходимости одновременного использования других офтальмологических лекарственных средств, интервал между применением таурина и других препаратов должен составлять не менее 10-15 минут.

Особые указания:

При нарушении целостности флакона, а

также при помутнении раствора, препарат использовать не следует.

При закапывании не вызывает жжения.

Следует избегать контакта с мягкими контактными линзами; следует удалить контактные линзы перед применением и выждать не менее 15 минут после закапывания препарата.

Необходимо следить за тем, чтобы кончик флакона-капельницы не контактировал с другими предметами и поверхностями. После закапывания флакон-капельницу плотно закрыть колпачком.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и потенциально опасными механизмами: Не влияет на способность управлять транспортным средством или потенциально опасными механизмами.

Форма выпуска:

Капли глазные по 10 мл в пластиковом флакон-капельнице. Один флакон вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не замораживать.

Срок годности:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

После вскрытия флакона использовать в течение 1 месяца.

Условия отпуска:

Без рецепта.



Произведено для:

BELINDA Laboratories LLP

Лондон, Великобритания

Производитель:

ООО Индиана Офтальмикс,

Индия