

ТОБРАМЕНС

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Тобраменс.

Международное непатентованное название: тобрамицин.

Лекарственная форма: глазная мазь.

Состав:

Тобрамицина сульфат USP экв.

тобрамицину 0,3% w/w

Стерильная мазевая основа q.s.

Фармакотерапевтическая группа:

антибиотик, аминогликозид.

Код АТХ: S01AA12.

Фармакологическое действие:

Фармакодинамика:

Антибиотик широкого спектра

действия из группы аминогликозидов.

Оказывает бактерицидное действие,

нарушая синтез белка и

проницаемость цитоплазматической

мембраны микробной клетки.

Активен в отношении следующих

восприимчивых микроорганизмов:

- *Staphylococci*, в том числе *S.aureus* и *S.epidermidis*

(коагулазоотрицательные и

коагулазоположительные), включая

штаммы, резистентные к

пенициллину.

- *Streptococci*, включая некоторые β -

гемолитические штаммы группы А,

негемолитические виды и

Streptococcus pneumoniae.

- *Pseudomonas Aeruginosa*, *Escherichia*

coli, *Klebsiella pneumoniae*,

Enterobacter aerogenes, *Proteus*

mirabilis (индол-отрицательный) и

индол-положительные виды *Proteus*,

Haemophilus influenzae и *H.aegyptius*,

Moraxella lacunata, *Acinetobacter*

calcoaceticus (*Herellea vaginacola*) и

некоторые виды *Neisseria*.

Фармакокинетика:

При местном применении системная

абсорбция низкая.

Показания к применению:

Инфекции глаза и его придатков:

- блефарит;
- конъюнктивит;
- кератоконъюнктивит;
- блефароконъюнктивит;
- кератит;
- иридоциклит.

Профилактика послеоперационных

инфекций.

Противопоказания:

• повышенная чувствительность к

компонентам препарата.

Беременность и период лактации:

Достаточного опыта по применению

препарата во время беременности и

кормления грудью нет. Возможно

применение для лечения беременных

и кормящих матерей по назначению

лечащего врача, если ожидаемый

лечебный эффект превышает риск

развития возможных побочных

эффектов.

Применение в педиатрии:

Достаточного опыта по применению

препарата в детском возрасте нет.

Возможно применение препарата по

назначению лечащего врача, если

ожидаемый лечебный эффект

превышает риск развития возможных

побочных эффектов.

Способ применения и дозы:

Местно.

При нетяжелом инфекционном процессе полоска мази около 1,5 см в конъюнктивальный мешок 2-3 раза в день.

При остром тяжелом инфекционном

процессе полоска мази около 1,5 см в конъюнктивальный мешок каждые 3-4 часа, с уменьшением частоты применения препарата по мере уменьшения явлений воспаления.

Побочное действие:

Местные: затуманивание зрения,

преходящий дискомфорт, зуд,

опухание века, раздражение,

конъюнктивальная эритема,

нечеткость зрительного восприятия

(при использовании глазной мази).

Передозировка:

При местном применении

передозировка маловероятна.

Лечение: следует промыть глаза

обильным количеством теплой воды.

Взаимодействие с другими

лекарственными препаратами:

В случае одновременного назначения

тобрамицина местно с системными

аминогликозидными антибиотиками,

возможно усиление побочных

эффектов системного характера.

При использовании нескольких

офтальмологических препаратов

местного применения, необходимо

соблюдать интервал между

применением препаратов от 10 до 15

мин. Мазь наносится в последнюю

очередь.

Особые указания:

Длительное применение антибиотика

может приводить к избыточному

росту невосприимчивых

микроорганизмов, в том числе грибов.

В случае возникновения

суперинфекции необходимо

назначить адекватную терапию.

Пациентам, использующим

контактные линзы, перед

применением препарата следует

снять линзы и установить их обратно

не ранее, чем через 15 минут после

закапывания препарата.

Пациентам, у которых после

применения препарата временно

снижается чёткость зрения, не

рекомендуется заниматься видами

деятельности, требующими

повышенного внимания и реакции до

ее восстановления.

Влияние на способность управлять

транспортными средствами и

механизмами:

Если у пациента после применения

препарата временно снижается

чёткость зрения, не рекомендуется

управлять автомобилем и заниматься

видами деятельности, требующими

повышенного внимания до его

восстановления.

Форма выпуска:

Мазь глазная 0,3% по 5 г в

алюминиевой тубе. Одна туба вместе

с инструкцией по применению в

картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от

света месте, при температуре не

выше 25°C. Хранить в недоступном

для детей месте. Не замораживать.

Срок годности:

Указано на упаковке. Не использовать

по истечении срока годности.

Условия отпуска:

По рецепту врача.