

ЦИКЛОНИТ

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Циклонит.

Международное непатентованное название:
циклоспорин.

Лекарственная форма: офтальмологическая эмульсия.

Состав: каждый мл содержит:

Циклоспорин USP 0,5 мг.

Фармакотерапевтическая группа:

Препарат для увлажнения и защиты роговицы

Код АТХ: S01XA18.

Фармакологическое действие:

Фармакодинамика:

Циклоспорин - вещество, оказывающее иммунодепрессивный эффект при системном введении. При угнетении продукции слезы у больных с сухим кератоконъюнктивитом, циклоспорин, применяемый местно, оказывает противовоспалительное и иммуномодулирующее действие.

Фармакокинетика:

Концентрация циклоспорина после местного применения у взрослых в концентрации 0,05% 2 раза в сутки ниже определяемого значения - 0,1 нг/мл.

Показания к применению:

Снижение слезопродукции вследствие сухого кератоконъюнктивита.

Противопоказания:

Υ гиперчувствительность к составу препарата.

Υ острые инфекционные заболевания глаз;

Υ беременность и период лактации;

Υ возраст до 18 лет;

Беременность и период лактации:

Препарат Циклонит назначать беременным женщинам не рекомендуется. При системном введении циклоспорин проникает в грудное молоко, экскреция с грудным молоком при местном применении не изучалась. При назначении в период лактации кормление грудью следует прекратить.

Способ применения и дозы:

Местно. Перед применением хорошо взболтать до получения однородной непрозрачной эмульсии.

Одна капля закапывается в конъюнктивальный мешок 2 раза в день с интервалом 12 ч.

При применении более одного местного офтальмологического препарата, их следует применять с 15-минутным интервалом.

Пациентам следует закрывать веки на 2 минуты после закапывания, чтобы уменьшить системную абсорбцию. Это способствует уменьшению системных побочных эффектов и увеличению местной активности препарата.

После использования сразу закрыть флакон крышкой.

Побочные действия:

Частота встречаемости побочных эффектов: очень частые (>10%), частые (>1%, <10%), нечастые (>0,1%, <1%); редкие (>0,01%, <0,1), очень редкие (<0,01%).

Очень частые: жжение в глазу.

Частые: раздражение глаза, гиперемия конъюнктивы глаза, ощущение инородного тела в глазу, боль и зуд в

глазу, выделение из глаза, затуманивание зрения, синдром сухого глаза, светобоязнь, головная боль.

Нечастые: кератит с изъязвлением, отек и гиперемия век, повышенное слезотечение, головокружение, тошнота, сыпь.

Частота неизвестна: отек конъюнктивы глаза и век, реакции повышенной чувствительности, крапивница.

Передозировка:

При местном применении препарата в виде офтальмологической эмульсии вследствие низкой концентрации циклоспорина передозировка маловероятна.

Взаимодействия с другими лекарственными препаратами:

Исследований взаимодействия с другими лекарственными препаратами не проводилось.

Одновременное применение циклоспорина с глазными каплями, содержащими кортикостероиды, может усилить воздействие циклоспорина на иммунную систему.

Особые указания:

Не допускайте прикосновения наконечника флакона к глазам и любой поверхности, чтобы исключить возможность инфицирования его содержимого.

Не следует допускать контакта препарата с мягкими контактными линзами. Удалите контактные линзы перед применением препарата, и повторно установите их не ранее, чем через 15 минут после закапывания.

После применения флакон немедленно закрыть.

Влияние на способность управления транспортными средствами и механизмами:

Пациент должен воздерживаться от управления автомобилем или работ с сложной техникой в случае любого нарушения зрения в ходе лечения препаратом.

Форма выпуска:

Офтальмологическая эмульсия 5 мл во флаконе капельнице. Один флакон вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте. Не замораживать.

Срок годности:

24 месяца. Не использовать по истечении срока годности.

После вскрытия флакона, препарат можно использовать в течение 30 дней. По истечении этого срока препарат следует выбросить.

Условия отпуска:

По рецепту врача.



Произведено по:
BELINDA Laboratories LLP
Лондон, Великобритания

Производитель:
Аристофарма Лтд.,
Бангладеш.